

Acilesol®

Rabeprazole sodium 20 mg x 14 gastro-resistant tablets

Най-бърз¹ и
моцнен²

Acilesol

Rabeprazole се характеризира с:

Най-бързо действие и контрол над симптомите¹ от всички инхибитори на протонната помпа (ИПП)¹

Мощен и продължителен антисекреторен ефект²

Удобен еднократен прием^{4*}

Ефект, без влияние от храната⁴

Минимален риск от лекарствени взаимодействия³

* Еднократен дневен прием при:

Активна дуоденална язва,


Активна доброкачествена стомашна язва,

Ерозивна или улцерозна ГЕРБ

Бърз


Rabeprazole бързо се активира, както при обичайно ниското pH на стомаха, така и при $\text{pH} > 5$ ⁵

Време за биологично активиране на различните ИПП, според pH




Rabeprazole инхибира **100%** протонната помпа още на **5-тата** минута⁶

Инхибиране на протонната помпа при различни ИПП




Мощен

Rabeprazole е по-мощен от останалите инхибитори на протонната помпа през първите 24 часа²



Rabeprazole е по-добър избор от esomeprazole при контролирането на ГЕРБ⁷



* (QOLRAD) Quality of Life in Reflux and Dyspepsia -Качество на живот при рефлукс и диспепсия

* Промяна в симптомите на ГЕРБ, след 4 седмична терапия е оценена на база: въпросник за промяна в качеството на живот и ендоскопски находки.

Rabeprazole повишава стомашното pH и го поддържа до стойности > 3 и > 4 **значително по-дълго време**, отколкото **esomeprazole**. Този ефект е особено изразен през нощта⁸

Rabeprazole 20 mg има **по-мощно антисекреторно** действие от **esomeprazole** 20 mg след първата доза⁸

Повтарящи се дози от **20 mg rabeprazole** имат **по-изразено антисекреторно** действие от многократно приложение на **esomeprazole 20 mg**, особено през нощта⁸

Инхибирането на базалната и стимулираната киселинна секреция с **Rabeprazole** продължава до 48 часа⁴

Acilesol

Показания ⁴	Дозировка ⁴	Продължителност на терапията ⁴
Активна дуоденална язва	20 mg веднъж дневно сутрин	4 до 8 седмици
Активна доброкачествена стомашна язва	20 mg веднъж дневно сутрин	6 до 12 седмици
Ерозивна или улцерозна ГЕРБ	20 mg веднъж дневно	4 до 8 седмици
Поддържащо лечение на ГЕРБ	20 mg веднъж дневно	Дългосрочно
Синдром на Zollinger-Ellison	начална доза 60 mg веднъж дневно дозата може да се увеличи до 120 mg – 2 по 60 mg дневно еднократната дневна доза може да е до 100 mg	Продължителността зависи от клиничния отговор
Ерадикация на <i>Helicobacter pylori</i> при пациенти с пептична язвена болест	20 mg два пъти дневно + кларитромицин 500 mg два пъти дневно + амоксицилин 1 g два пъти дневно	7 дни

*Не е необходима корекция на дозата при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане.⁴



Референции:

1. Review article: pH, healing and symptom relief with rabeprazole treatment in acid-related disorders M. ROBINSON Oklahoma Foundation for Digestive Research, University of Oklahoma, Oklahoma City, OK, USA 2. D. Pantoflickova¹, G. Dorta¹, M. Ravic², P. Jornod¹, A. L., Acid inhibition on the first day of dosing: comparison of four proton pump inhibitors, *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, Volume 17, Issue 12, pages 1507-1514, June 2003; 3. Blume H, Donath F, Warnke A. et al. *Drug Saf.* 2006; 29(9): 769-84. April 2014, Volume 37, Issue 4, pp 201-211; 4. КХП на Acilesol 20mg; 5. Kromer W, Kruger U, Huber R, Hartmann M, Steinijans VW. Differences in pH-dependent activation rates of substituted benzimidazoles and biological in vitro correlates. *Pharmacology*. 1998;56:57-70.; 6. Besancon M, Simon A, Sachs G, Shin JM. Sites of reaction of the gastric H,K-ATPase with extracytoplasmic thiol reagents. *J Biol Chem*. 1997;272:22438-22446.; 7. *J Pharmacol Pharmacother*. 2011 Jul-Sep; 2(3): 150-157, Rituparna Maiti, Jyothirmai Jaide, P. L. John Israel, Narendar Koyagura, Sruthi Mukkisa, and Anuradha Palani; 8. Effects of rabeprazole, 20 mg, or esomeprazole, 20 mg, on 24-h intragastric pH and serum gastrin in healthy subjects, S. Warrington¹, K. Baisley¹, M. Boyce¹, B. Tejura¹, A. Morocutti², N. Miller², *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, Volume 16, Issue 7, pages 1301-1307, July 2002

Отпуска се по лекарско предписание.

КХП Acilesol - 25.9.2020

За повече информация

Тева Фарма ЕАД

ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България

Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86

IAL: 54065/08.12.2020

CARD-BG-00102

Acilesol®

Rabeprazole sodium 20 mg x 14 gastro-resistant tablets

teva