


AVANOR

Atorvastatin 10 mg film-coated tablets
Atorvastatin 20 mg film-coated tablets




AVANOR®


Atorvastatin 10 mg film-coated tablets
Atorvastatin 20 mg film-coated tablets

teva


36% редуция на риска от нефатален МИ и фатална коронарна болест на сърцето в групата на Atorvastatin - ASCOT LLA




23% намаление на риска от фатален и нефатален инсулт в групата на Atorvastatin - ASCOT LLA



19% намаление на честотата на всички СС събития и процедури в групата на Atorvastatin - ASCOT LLA




15% намаление на смъртността по всички причини в групата на Atorvastatin - ASCOT LLA



European Heart Journal (2008) 29, 499-508 doi:10.1093/eurheartj/ehm583; The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial lipid lowering arm: extended observations 2 years after trial closure; Peter S. Sever* et al

Значима редуция на съдовите събития в групата на Atorvastatin във всички съдови области



Разпределение на първо и последващи събития според съдовите области

С 390 по-малко съдови събития в групата на Atorvastatin срещу 164 по-малко първи съдови събития. Въпреки че мозъчно-съдовите събития са 60% от общия брой, коронарните прогресивно увеличават пропорциите след първото събитие. Намалването на събитията, в групата на Atorvastatin е очевидно във всяка съдова област събития

Journal of the American College of Cardiology 2020 vol.75 No17 2020. Published by Elsevier The SPARKL Trial

Avanor - терапевтични показания

- Хиперхолестеролемия**
 - Аторвастатин се прилага като допълнение към диетата за намаляване на повишения общ холестерол (общ-С), LDL-холестерол (LDL-C), аполипопротеин В и триглицеридите при възрастни, юноши и деца на възраст на и над 10 години с първична хиперхолестеролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготен вариант) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (отговаряща на тип IIa или тип IIb съгласно класификацията на Frederickson), ако резултатът от диета и други нефармакологични мерки е незадоволителен.
 - Освен това, аторвастатин е показан за понижаване на общия и LDL-холестерол при възрастни с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия, като допълнение към друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL-афереза) или ако няма възможност за такова лечение.
- Профилактика на сърдечно-съдови заболявания**
 - Аторвастатин е показан за профилактика на сърдечно-съдови събития при възрастни пациенти, за които е известно, че са с висок риск от първи сърдечно-съдов инцидент, като допълнение за корекция на други рискови фактори

КХП Avanor

Отпуска се по лекарско предписание.

КХП Avanor - 04/11/2019

За повече информация

Тева Фарма ЕАД

ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България
Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86
IAL: 54064/08.12.2020

AVANOR

Avanor 10 mg film-coated tablets
Avanor 20 mg film-coated tablets

CARD-BG-00122