


# Clopidogrel Actavis®

Clopidogrel bisulphate 75 mg x 30 tabl.



**Доказано  
подобрява  
прогнозата<sup>(1)</sup>**



**teva**

**Clopidogrel е доказана и изпитана терапия, която присъства във всички ръководства за лечение на остър и хроничен коронарен синдром <sup>(2,3)</sup>**

**Clopidogrel 75 mg дневно се препоръчва като алтернатива при пациенти с непоносимост**

**към ASA (Клас I, B) <sup>(2)</sup>**

**\* Превенция на съдови събития**

**Clopidogrel се препоръчва в комбинация с ASA при пациенти подлежащи на фибринолиза (IA) <sup>(2)</sup>**

**Clopidogrel в доза 75mg дневно е средство на избор при пациенти след миокарден инфаркт, които толерират двойна антитромбоцитна терапия с ASA (75 - 100 mg) в продължение на 1 година <sup>(2)</sup>**

**\* пациенти с висок или умерен риск от исхемични събития, които нямат висок риск откървене**

**Clopidogrel се препоръчва в комбинация с ASA перипроцедурно при пациенти, подлежащи на имплантация на коронарен стент (IC) <sup>(2)</sup>**

**Clopidogrel се препоръчва в комбинация с ASA при пациенти след TAVR\* (IIA) <sup>(7)</sup>**

\* TAVR - транскатетърно аортно клапно протезиране

\*\* ПАБ - периферна артериална болест

**Clopidogrel Actavis<sup>®</sup>**  
Clopidogrel bisulphate 75 mg x 30 tabl.

## Clopidogrel във вторичната профилактика на исхемичен мозъчен инсулт

Продължителната терапия с Clopidogrel при пациенти със съдова атеросклероза е по-ефективна от ASA в намаляване на комбинирания риск от инсулт, миокарден инфаркт или съдова смърт<sup>(9)</sup>

Clopidogrel в комбинация с ASA се препоръчва при пациенти с пресен исхемичен инсулт и нестабилна стенокардия, не-Q миокарден инфаркт или скорошно стентирание. Лечението следва да бъде провеждано до 9 месеца след събитието (I, A)<sup>(4)</sup>

## Clopidogrel при пациенти с периферна артериална болест

Антитромбоцитна терапия с Clopidogrel (75 mg дневно) или ASA самостоятелно (75–325 mg дневно) се препоръчва за редуция на Миокарден инфаркт, Инсулт или смърт от съдов произход при пациенти със симптоматична ПАБ\*\* (IA)<sup>(6)</sup>

Clopidogrel (75 mg на ден) се препоръчва като безопасна и ефективна алтернатива на антиагрегантна терапия с ASA за намаляване на риска от Миокарден инфаркт, исхемичен мозъчен инсулт или съдова смърт при хора с ПАБ\*\* на долни крайници, включително и тези с claudicatio intermittens или критична изхимия на крайника, преди реваскуларизация на долните крайници (ендоваскуларна или хирургична) или преди ампутация на долен крайник (IB)<sup>(5)</sup>

# Clopidogrel е единственият ADP-рецепторен антагонист, който редуцира риска при пациенти с ПАБ\*\*<sup>(5)</sup>

**ИНЦИДЕНТ**

**Clopidogrel 75 mg**

симптоматична ПАБ

Клас I, A

## Clopidogrel е показан при:<sup>(8)</sup>

- Възрастни пациенти с инфаркт на миокарда (от няколко дни до 35 дни)
- Ишемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец)
- Установено периферно артериално заболяване
- Възрастни пациенти с предсърдно мъждене, които имат поне един рисков фактор за съдови инциденти, които не са подходящи за лечение с антагонист на витамин К (VKA) и които имат нисък риск за кървене, в комбинация с ASA за предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти, включително инсулт

1. N Engl J Med, Vol. 345, No. 7 August 16, 2001 p. 501

2. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes European Heart Journal (2019) 00, 171

3. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

4. Национален консенсус за профилактика, диагноза и лечение на мозъчносъдовите заболявания

5. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ КЛИНИЧНО РЪКОВОДСТВО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ

6. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease

7. Otto CM, Kumbhani DJ, Alexander KP, Calhoon JH, Desai MY, Kaul S, et al. 2017 ACC expert consensus decision pathway for transcatheter aortic valve replacement in the management of adults with aortic stenosis. J Am Coll Cardiol 2017;69:1313–46.

8. КХП Клопидогрел Актавис

9. TheLancet, volume348, p.1329-1339

Отпуска се по лекарско предписание.

КХП Clopidogrel Actavis - 2.10.2020

**За повече информация**

Тева Фарма ЕАД

ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България

Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86

IAL: 54049/08.12.2020

CLOP-BG-00006